



Sjúkdómssgreining eða ástæða til rannsóknar

Læknir

Kennitala, nafn og heimilisfang sjúklings

Innliggjandi sjúklingur á FSA. Deild \_\_\_\_\_ stofa \_\_\_\_\_

Ambúlant sjúklingur sendur til sýnitöku á FSA

Innliggjandi sjúklingur á annarri stofnun \_\_\_\_\_ deild \_\_\_\_\_

Sýni frá ambúlant sj. sent rannsóknad. FSA, sendandi: \_\_\_\_\_

Sjúklingar eru undanþegnir greiðslu samkvæmt lögum. Greiðsla sjúklings er því Kr. 0

Athugasemd sendanda til rannsóknadeildar:

Skilaboð sendanda sem birtast á svarblaði:

GÓNÓKOKKAR (Neisseria gonorrhoea) – RÆKTUN

Sýnistegund:  strok frá þvagrás  strok frá leghálsi  \_\_\_\_\_

Sýni tekið \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Sýklalyfjameðferð undanfarna daga: \_\_\_\_\_

Sýni kom til rannsóknar \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

SMÁSJÁRSKOÐUN: Gramneikvæðir diplókokkar \_\_\_\_\_, hvít blóðkorn \_\_\_\_\_, annað \_\_\_\_\_

RÆKTUN:  Enginn,  lítill,  mikill vöxtur af Neisseria gonorrhoea

NÆMISPRÓF (með skífum, S = gott næmi, I = lélegt næmi, R = ekkert næmi):

PENICILLIN \_\_\_\_\_ SPECTINOMYCIN \_\_\_\_\_ TETRACYCLINE \_\_\_\_\_

CEFTRIAZONE \_\_\_\_\_ CIPROFLOXACIN \_\_\_\_\_ ERYTHROMYCIN \_\_\_\_\_

Athugasemdir

Meinatæknir

KLAMYDÍA (Chlamydia trachomatis) – MEIA aðferð

Sýnistegund:  leghálsstrok  þvagrásarstrok

Sýni tekið \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Sýni kom til rannsóknar \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

NIÐURSTAÐA: \_\_\_\_\_ AFLESTUR: \_\_\_\_\_

Athugasemdir

Meinatæknir

HIV MÓTEFNI

Sýni tekið \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Sýni kom til rannsóknar \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

NIÐURSTAÐA: \_\_\_\_\_

Athugasemdir

Meinatæknir